

¿Niño inconsciente?



Pedir ayuda a las personas del entorno



Si hay 2 reanimadores

Reanimador 1: inicia RCP
Reanimador 2: llama a 112 y busca y coloca el DESA



Abrir la vía aérea
• Frente- mentón
• Tracción / elevación mandibular



¿Respira?
VER - OIR - SENTIR



Posición de seguridad

Si



Realiza 5 insuflaciones de rescate



Si hay 1 reanimador

Reanimador con MÓVIL:
Llama al 112 con modo manos libres y sigue con RCP



Valora:
• Signos vitales
• Pulso / Sólo sanitarios



Ventilaciones 20 / min

Si



Inicia compresiones torácicas (30)



Realiza 2 ventilaciones



Seguir con 30 compresiones / 2 ventilaciones



Si hay 1 reanimador

TRAS 1 MINUTO DE RCP ACTIVAR SISTEMA DE EMERGENCIAS - SEM (112)

COLOCAR DESA si está disponible, y continuar con maniobras de RCP

Si hay 2 reanimadores

SEGUIR CON LAS VENTILACIONES Y COMPRESIONES
Tras un minuto de RCP COLOCAR DESA si está disponible y continuar con maniobras de RCP.
Cada 2 minutos se debe intercambiar la posición de los reanimadores (ventilaciones - compresiones)

Continuar RCP (ventilaciones y compresiones).
No interrumpir en ningún momento salvo que aparezcan signos claros de circulación (movimientos, tos)